

Arbeitshilfe der Bundesapothekerkammer zur Qualitätssicherung

FORMBLATT

- **Hygieneplan für die Durchführung der
Gripeschutzimpfung in der öffentlichen Apotheke**

Stand des Entwurfs: 02.03.2020

Leitlinie:

Hygienemanagement
Durchführung von Gripeschutzimpfungen in öffentlichen Apotheken








Im Folgenden ist beispielhaft ein Hygieneplan für die Durchführung der Gripeschutzimpfung dargestellt. Der Plan erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und muss in jedem Fall den Gegebenheiten in der Apotheke angepasst werden. Geeignete Reinigungs- und Desinfektionsmittel sind in den Plan einzutragen. Die Einwirkzeiten der Desinfektionsmittel sind zu beachten.

Die Mitarbeiter, die in der Apotheke Gripeschutzimpfungen durchführen, sind über die besonderen Hygienemaßnahmen regelmäßig zu unterweisen.

ENTWURF








■ Arbeitshilfe zur Qualitätssicherung

Hygieneplan Grippeschutzimpfung

	Was	Wann	Wie	Womit	Wer
	Schutzkittel anziehen und schließen	Vor der Impfung		Separater Arbeitskittel, z. B. aus Baumwolle, mit langen Ärmeln	Impfender Apotheker
	Hände waschen		1. Sorgfältige Reinigung mit warmem Wasser und Waschlotion 2. Gründlich nachspülen 3. Sorgfältig abtrocknen	Hautschonende Waschlotion aus dem Spender	
	Einmalhandschuhe anziehen			Medizinische Einmalhandschuhe	
	Einstichstelle am Oberarm desinfizieren		1. Einstichstelle desinfizieren 2. Mit Tupfer wischen 3. Erneut desinfizieren 4. Trocknen lassen	Hautdesinfektionsmittel (VAH-gelistet) Zellstofftupfer	Impfender Apotheker
	Tupfer auf Einstichstelle drücken	Nach der Impfung		Zellstofftupfer	Impfender Apotheker/Patient
	Fertigspritze mit Kanüle Verbrauchsmaterial		Entsorgen	Gemäß Entsorgungsplan	Impfender Apotheker
	Flächen im Arbeitsbereich		Desinfizieren	Geeignetes ausreichend viruzides Desinfektionsmittel (VAH-gelistet)	
			Feucht wischen	Wasser mit Allzweckreiniger	
	Händedesinfektion/-reinigung		Hände desinfizieren bei Unterbrechung und nach Beendigung der Tätigkeit Bei Verschmutzung reinigen	<ul style="list-style-type: none"> Händedesinfektionsmittel (VAH-gelistet) aus dem Spender Hautschonende Waschlotion aus dem Spender 	

Mit freundlicher Genehmigung der Apothekerkammer Westfalen-Lippe

Hygieneplan Blutuntersuchung (schwarz/weiß)

	Was	Wann	Wie	Womit	Wer
	Schutzkittel anziehen und schließen	Vor der Impfung		Separater Arbeitskittel, z. B. aus Baumwolle, mit langen Ärmeln	Impfender Apotheker
	Hände waschen		1. Sorgfältige Reinigung mit warmem Wasser und Waschlotion 2. Gründlich nachspülen 3. Sorgfältig abtrocknen	Hautschonende Waschlotion aus dem Spender	
	Einmalhandschuhe anziehen			Medizinische Einmalhandschuhe	
	Einstichstelle am Oberarm desinfizieren		1. Einstichstelle desinfizieren 2. Mit Tupfer wischen 3. Erneut desinfizieren 4. Trocknen lassen	Hautdesinfektionsmittel (VAH-gelistet) Zellstofftupfer	Impfender Apotheker
	Tupfer auf die Einstichstelle drücken			Zellstofftupfer	Impfender Apotheker/Patient
	Fertigspritze mit Kanüle Verbrauchsmaterial	Nach der Impfung	Entsorgen	Gemäß Entsorgungsplan	Impfender Apotheker
	Flächen im Arbeitsbereich		Desinfizieren	Geeignetes ausreichend viruzides Desinfektionsmittel (VAH-gelistet)	
			Feucht wischen	Wasser mit Allzweckreiniger	
	Händedesinfektion/-reinigung		Hände desinfizieren bei Unterbrechung und nach Beendigung der Tätigkeit Bei Verschmutzung reinigen	<ul style="list-style-type: none"> Händedesinfektionsmittel (VAH-gelistet) aus dem Spender Hautschonende Waschlotion aus dem Spender 	

Mit freundlicher Genehmigung der Apothekerkammer Westfalen-Lippe